

AQUACEL® BEHANDELPROTOCOL

Indicatie:	Verbandwisselingsadvies:	Wondaspect bij AQUACEL®	Advies
Tweedegraads schaafwonden en tweede-graads brandwonden.	DAG 0/2 Zie "aanbrengen AQUACEL® verband".	Bij twijfel over contaminatie op DAG 0	Bij twijfel over contaminatie op dag 0: Flammazine aanbrengen en op DAG 1 de behandeling met AQUACEL volgens protocol vervolgen.
Verwijs-criteria: Functionele gebieden: handen, voeten, genitaliën en gelaat. Bij verdenking op diep tweedegraads binnen 3 dagen consult plastisch chirurg.	DAG 2/5 Contrôle op verkleving. Bij het niet geheel bedekken van de brandwond of schaafwond door verschuiving of krimpen van AQUACEL®, extra AQUACEL® verband bijleggen (zie casuïstiek). Alléén bij totale verzadiging van AQUACEL®, AQUACEL® verband verwisselen.	AQUACEL® ligt nog geheel los op DAG 2	AQUACEL® verband vervangen door nieuwe AQUACEL® verband.
TVLO > 10% bij volwassenen TVLO > 5% bij kinderen	DAG 5/12 Indien noodzakelijk patiënt 1-2 maal op controle.	AQUACEL® is niet verkleefd op DAG 4	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle op infectie, overweeg een behandeling met Flammazine® in overleg met arts. • Lokatie van de brandwond of schaafwond is onderhevig aan te veel beweging, overweeg immobilisatie. • De brandwond is mogelijk derdegraads, behandeling starten volgens het "derde graads" behandelprotocol in overleg met arts.
Contra-indicatie: <ul style="list-style-type: none"> • Geïnficeerde brandwonden • Oude (> 8 uur) onbehandelde brandwonden i.v.m. dan al aanwezige contaminatie • Eerste- en derdegraads brandwonden <ul style="list-style-type: none"> - Eerstegraads: koelen en vet houden - Derdegraads: zie protocol intranet. 	DAG 12/14 AQUACEL® korst insmeren met vaseline/paraffine ter versoepeling van de korst. Tevens laat de AQUACEL® korst dan vanzelf los. Hierna de genezen huid insmeren met Alhydran®.	Op DAG 10/14 is de brandwond (of delen daarvan) nog niet genezen.	De brandwond of de restdefecten zijn mogelijk derdegraads, behandeling starten volgens het "derde graads" behandelprotocol in overleg met arts.
Aanbrengen AQUACEL® verband: Onmiddellijk koelen gedurende 15-20 minuten. Restanten kapot blaardak verwijderen. <ul style="list-style-type: none"> • AQUACEL® verband hoeft niet geknipt te worden, ruim overlappen (4 à 5 cm.) over de wondranden én over de naastliggende AQUACEL® verbanden i.v.m. krimpen van het verband. • AQUACEL® verband direct op de wond aanbrengen. • AQUACEL® verband afdekken met non-woven gaas en fixeren met elastische windsel en/of netverband. 	Bij verkleving blijft AQUACEL® verband in situ totdat het loslaat. Versoepeling van de korst bewerkstelligen door de AQUACEL® korst vanaf DAG 12 in te smeren met vaseline/paraffine. AQUACEL® verband dient niet losgeweekt te worden om de voortgang van de epithelialisatie niet te verstoren.	Pus	I.o.m. arts wondkweek afnemen. AQUACEL® verband verwijderen en behandeling in overleg met arts vervolgen met Flammazine
*TVLO: Totaal Verband LichaamsOppervlak +zie protocol in DKS		Op DAG 10/14 is de brandwond (of delen daarvan) nog niet genezen.	Consulteer zn. de wond- en decubitus-consultant bij verband controle.
		Advies aan de patiënt: <ul style="list-style-type: none"> • Leg uit dat het verband er grauw en bruin uit gaat zien. Dit aspect is normaal! • AQUACEL® verband wordt in de loop van de behandeling een "stevige" korst, dit zou lastig kunnen zijn voor de patiënt. Adviseer de patiënt hier absoluut niet aan te trekken of los te weken! Versoepeling van de korst bewerkstelligen door de korst vanaf DAG 12 in te smeren met Vaseline/Paraffine. • Het verband mag niet nat worden. 	

Brandwondencentra

Beverwijk: 0251-265 555 / Rotterdam: 010-290 30 00 / Groningen: 050 - 524 52 45

PRODUCTOVERZICHT

AQUACEL®

Omschrijving	formaat	bestel-nr.	steriel verpakt per
	5 x 5 cm	177901	10
	10 x 10 cm	177902	10
	15 x 15 cm	177903	5
	10 x 4 cm	403730	10
	20 x 4 cm	403731	10
	30 x 4 cm	403732	10

Protocol voor brandwonden, schaafwonden

versie III - 02.2009


TweeSteden
ziekenhuis

Bij twijfel over behandeling vraag altijd advies.
Dit protocol is mede mogelijk gemaakt door:



® AQUACEL is een handelsmerk van ConvaTec Inc.
© 2009 ConvaTec Nederland BV

St. Elisabeth Ziekenhuis



Casuïstiek AQUACEL® steekvlamverbranding

Tweedegraads steekvlamverbranding



DAG 1



DAG 1: na aanbrengen AQUACEL®verband.



DAG 2: onvoldoende overlap AQUACEL®verband.



DAG 2: extra AQUACEL®verband ruim aangebracht.



DAG 5/12: indrogen wond-exsudaat in AQUACEL®verband duidelijk zichtbaar.



DAG 12/14: AQUACEL® korst insmeren met Vaseline/paraffine ter versoepeling van de korst. Tevens laat de AQUACEL® korst dan vanzelf los.



DAG 12/14: Zodra de AQUACEL® korst is losgekomen, de genezen huid insmeren met Alhydran®.



Na 2 maanden